НорПэг™ – М 200

МЕТОКСИПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛИ

Наименование показателя	Значение	Метод испытаний
Внешний вид	Прозрачная жидкость от бесцветного до желтого цвета	п. 5.2
Цветность, ед. Хазена	70	ГОСТ 29131 и п. 5.3
Гидроксильное число, мг/КОН/г, в пределах	326-340	Стандарт ИСО 4326
Среднее значение молекулярной массы, в пределах	-	п.5.5
Концентрация водородных ионов (pH) водного раствора с массовой долей основного вещества 5%, в пределах	11-12	Стандарт ИСО 4316 и п. 5.4
Массовая доля воды, %, не более	0,05	Стандарт ИСО и п.5.6
Температура кристаллизации в приборе Жукова, ^{0}С, в пределах	-	ГОСТ 18995.5
Примечание: По требованию потребителя допускается выпускать продукт с другой молекулярной массой и с соответствующими ей нормами, согласованными обеими сторонами		

УПАКОВКА:

Полиэтиленовые бочки вместимостью 220 дм^3, 227 дм^3. По согласованию с потребителем допускается использовать другой вид тары.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Применяются в производстве косметики и средств гигиены, смазочных материалов, красок, адгезивов и эмульсий, в фармацевтике, металлообработке, в нефтехимии, в текстильной промышленности, в производстве добавок к бетонным смесям.